

“Spørgeskema omkring håndtering og behandling af hovedpine i kiropraktor praksis”
Danish generic version

Den generiske version til anvendelse af sundhedsprofessionelle generelt.

Flere af spørgsmålene kan modificeres i forhold til profession og øvrige omstændigheder.

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema
	1. Demografi Denne sektion omhandler dig som kliniker
1	Hvad er dit køn i. Kvinde ii. Mand iii. Anden kønsidentitet
2	Hvad er din alder
3	Hvor mange dage om ugen arbejder du i klinik? i. 1 dag ii. 2 dage iii. 3 dage iv. 4 dage v. 5 dage
4	Hvor mange år har du været aktiv som kliniker? i. Er i turnusstilling ii. 1-4 iii. 5-10 iv. 11-15 v. >15
5	Hvor har du modtaget din uddannelse som [navn på profession]? i. [Relevant land] ii. iii. iv. v. Andet – angiv hvor
6	Hvor mange [navn på profession] er der på din primære arbejdsplads (inkl. dig selv)?
7	Er der andet sundhedspersonale på klinikken? (Sæt X ved alle relevante svar) i. [Relevant sundhedspersonale] ii. iii. iv. v. Andet sundhedspersonale (angiv hvilke)
8	Har du andre uddannelser? i. Ja ii. Nej iii. Hvis ja, hvilke andre uddannelser
9	I hvilken region praktiserer du? (primære arbejdsplads) i. Region Nordjylland ii. Region Midtjylland

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema
	iii. Region Syddanmark iv. Region Sjælland v. Region Hovedstaden vi. Uden for Danmark
	2. Hovedpine guideline [navn på relevant guideline] Dette afsnit omhandler din viden om og din anvendelse af [navn på relevant guideline]
10	Kender du indholdet i [navn på relevant guideline] i. Ja, det hele ii. Ja, det meste iii. Ja, noget af det iv. Nej
11	Har guideline ændret din daglige praksis? i. Ja, meget ii. Ja, i nogen grad iii. Nej, min praksis fulgte allerede anbefalingerne i guideline iv. Nej, slet ikke Hvis ja, fortsæt til spørgsmål 11, ellers fortsæt til spørgsmål 12.
12	Indenfor hvilke områder (angiv ja/nej, hvor det er relevant) i. [Relevant område] ii. iii. iv. v. Andet
	3. Primære hovedpinetyper Denne sektion omhandler brugen af diagnostiske kriterier for primære hovedpinetyper. Spørgsmål 13-20 omhandler de diagnostiske kriterier for primære typer af hovedpiner i overensstemmelse med den Internationale Hovedpine Klassifikation (ICHD)
13	Hvor fortrolig er du med nedenstående diagnostiske kriterier for spændingshovedpine? i. Meget fortrolig ii. Delvist fortrolig iii. Lidt fortrolig iv. Ikke fortrolig
14	Angiv hvilke dele af de diagnostiske kriterier for spændingshovedpine, du er <i>delvist fortrolig, lidt fortrolig eller ikke fortrolig</i> med. Sæt X ved alle relevante svar. Hvis du er meget fortrolig med kriterierne, kan du gå videre til spørgsmål 15. (Diagnostiske kriterier indsættes her)
15	Hvor fortrolig er du med nedenstående diagnostiske kriterier for migræne? i. Meget fortrolig ii. Delvist fortrolig iii. Lidt fortrolig iv. Ikke fortrolig
16	Angiv hvilke dele af de diagnostiske kriterier for migræne, du er <i>delvist fortrolig, lidt fortrolig eller ikke fortrolig</i> med. Sæt X ved alle relevante svar. Hvis du er meget fortrolig med kriterierne, kan du gå videre til spørgsmål 17. (Diagnostiske kriterier indsættes her)
17	Hvor fortrolig er du med nedenstående diagnostiske kriterier for klyngehovedpine? i. Meget fortrolig ii. Delvist fortrolig iii. Lidt fortrolig iv. Ikke fortrolig

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																									
18	Angiv hvilke dele af de diagnostiske kriterier for klyngehovedpine, du er <i>delvist fortrolig</i> , <i>lidt fortrolig</i> eller <i>ikke fortrolig</i> med. Sæt X ved alle relevante svar. Hvis du er meget fortrolig med kriterierne, kan du gå videre til spørgsmål 19. (Diagnostiske kriterier indsættes her)																																									
19	Tager din diagnose udgangspunkt i de diagnostiske kriterier for primære hovedpinetyper? i. Ja ii. Nej																																									
20	I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn angående de diagnostiske kriterier for primære hovedpinetyper? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Meget uenig</th> <th>Uenig</th> <th>Hverken enig eller uenig</th> <th>Enig</th> <th>Meget enig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kriterierne for diagnosticering af primær hovedpine er klare.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kriterierne for primære hovedpinetyper er lette at anvende</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kriterierne passer godt på mine patienter med primære hovedpinetyper</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med primære hovedpinetyper</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Meget uenig	Uenig	Hverken enig eller uenig	Enig	Meget enig	Kriterierne for diagnosticering af primær hovedpine er klare.						Kriterierne for primære hovedpinetyper er lette at anvende						Kriterierne passer godt på mine patienter med primære hovedpinetyper						De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med primære hovedpinetyper						De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)					
	Meget uenig	Uenig	Hverken enig eller uenig	Enig	Meget enig																																					
Kriterierne for diagnosticering af primær hovedpine er klare.																																										
Kriterierne for primære hovedpinetyper er lette at anvende																																										
Kriterierne passer godt på mine patienter med primære hovedpinetyper																																										
De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med primære hovedpinetyper																																										
De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)																																										
	4. Sekundære hovedpinetyper Denne sektion omhandler brugen af diagnostiske kriterier for sekundære hovedpinetyper Spørgsmål 21-26 vedrører de diagnostiske kriterier for sekundære hovedpinetyper i overensstemmelse med den Internationale Hovedpine Klassifikation (ICHD)																																									
21	Hvor fortrolig er du med nedenstående diagnostiske kriterier for cervikogen hovedpine? i. Meget fortrolig ii. Delvist fortrolig iii. Lidt fortrolig iv. Ikke fortrolig																																									
22	Angiv hvilke dele af de diagnostiske kriterier for cervikogen hovedpine, du er <i>delvist fortrolig</i> , <i>lidt fortrolig</i> eller <i>ikke fortrolig</i> med. Sæt X ved alle relevante svar. Hvis du er meget fortrolig med kriterierne, kan du gå videre til spørgsmål 23. (Diagnostiske kriterier indsættes her)																																									
23	Hvor fortrolig er du med nedenstående diagnostiske kriterier for medicinoverforbrugshovedpine? i. Meget fortrolig ii. Delvist fortrolig																																									

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																									
	iii. Lidt fortrolig iv. Ikke fortrolig																																									
24	Angiv hvilke dele af de diagnostiske kriterier for medicinoverforbrugshovedpine, du er <i>delvist fortrolig</i> , <i>lidt fortrolig</i> eller <i>ikke fortrolig</i> med. Sæt X ved alle relevante svar. Hvis du er meget fortrolig med kriterierne, kan du gå videre til spørgsmål 25. (Diagnostiske kriterier indsættes her)																																									
25	Tager din diagnose udgangspunkt i de diagnostiske kriterier for sekundære hovedpinetyper? i. Ja ii. Nej																																									
26	I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn angående de diagnostiske kriterier for sekundære hovedpinetyper? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Meget uenig</th> <th>Uenig</th> <th>Hverken enig eller uenig</th> <th>Enig</th> <th>Meget enig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kriterierne for diagnosticering af sekundær hovedpine er klare</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kriterierne for sekundære hovedpinetyper er lette at anvende</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kriterierne passer godt på mine patienter med sekundære hovedpinetyper</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med sekundære hovedpinetyper</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Meget uenig	Uenig	Hverken enig eller uenig	Enig	Meget enig	Kriterierne for diagnosticering af sekundær hovedpine er klare						Kriterierne for sekundære hovedpinetyper er lette at anvende						Kriterierne passer godt på mine patienter med sekundære hovedpinetyper						De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med sekundære hovedpinetyper						De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)					
	Meget uenig	Uenig	Hverken enig eller uenig	Enig	Meget enig																																					
Kriterierne for diagnosticering af sekundær hovedpine er klare																																										
Kriterierne for sekundære hovedpinetyper er lette at anvende																																										
Kriterierne passer godt på mine patienter med sekundære hovedpinetyper																																										
De diagnostiske kriterier har indflydelse på min håndtering af patienter med sekundære hovedpinetyper																																										
De diagnostiske kriterier hjælper mig i kommunikationen med andre sundhedsprofessionelle (fx patienthenvisning og tværfaglig håndtering)																																										
	5. Andre hovedpinetyper og blandingshovedpine																																									
27	Anvender du andre betegnelser eller ord til at diagnosticere hovedpinetyper, foruden dem der er anbefalet ICHD-klassifikationen (primær eller sekundær)? i. Ja ii. Nej iii. Hvis ja, hvilke andre betegnelser eller ord anvender du? (angiv hvilke)																																									
28	Hvor mange procent af de hovedpinepatienter, du ser, vil du vurdere har blandingshovedpine? i. 0-10% ii. 11-20% iii. 21-30% iv. 31-50% v. >50%																																									
29	Hvilken kombination ser du hyppigst?																																									

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema
	i. [Relevant kombination] ii. ... iii. ... iv. Andre kombinationer
	6. Anamnese og undersøgelse Denne sektion omhandler din tilgang til anamnese og objektiv undersøgelse af hovedpinepatienter Anamnese og objektiv undersøgelse kan adskille primære fra sekundære hovedpinetyper ved at afdække eventuelle advarselstegn på en alvorlig sekundær hovedpine. Den bør afdække om patienten har andre fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som kan have betydning for hovedpinesygdommen.

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																																											
30	Hvor ofte indeholder anamnesen nedenstående elementer i forbindelse med udredning og diagnostik af nye hovedpinepatienter? (Ved 'ny patient' forstås en patient, der aldrig har været i klinikken før, en tidligere patient med hovedpine som nyt problem, eller en patient med tilbagevendende kendt hovedpine efter min. ½ år uden hovedpine). <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almene anamnesticke oplysninger (almen helbredstilstand, tidligere traumer etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beskrivelse af hovedpine (lokalisering, debut, varighed etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedpine karakter (intensitet, smertekvalitet, ledsagesymptomer, døgnvariation etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Årsager (udløsende faktorer, disponerende faktorer, forværrende og forbedrende faktorer etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prædisponerende faktorer (nakke- og/eller kæbesmerter, fysisk anstrengelse, voldsom hoste, stress etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reaktionsmønster (påvirkning af funktionsniveau, medicinindtag etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generel helbredstilstand mellem anfald</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidligere undersøgelser og anden behandling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Almene anamnesticke oplysninger (almen helbredstilstand, tidligere traumer etc.)						Beskrivelse af hovedpine (lokalisering, debut, varighed etc.)						Hovedpine karakter (intensitet, smertekvalitet, ledsagesymptomer, døgnvariation etc.)						Årsager (udløsende faktorer, disponerende faktorer, forværrende og forbedrende faktorer etc.)						Prædisponerende faktorer (nakke- og/eller kæbesmerter, fysisk anstrengelse, voldsom hoste, stress etc.)						Reaktionsmønster (påvirkning af funktionsniveau, medicinindtag etc.)						Generel helbredstilstand mellem anfald						Tidligere undersøgelser og anden behandling					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																							
Almene anamnesticke oplysninger (almen helbredstilstand, tidligere traumer etc.)																																																												
Beskrivelse af hovedpine (lokalisering, debut, varighed etc.)																																																												
Hovedpine karakter (intensitet, smertekvalitet, ledsagesymptomer, døgnvariation etc.)																																																												
Årsager (udløsende faktorer, disponerende faktorer, forværrende og forbedrende faktorer etc.)																																																												
Prædisponerende faktorer (nakke- og/eller kæbesmerter, fysisk anstrengelse, voldsom hoste, stress etc.)																																																												
Reaktionsmønster (påvirkning af funktionsniveau, medicinindtag etc.)																																																												
Generel helbredstilstand mellem anfald																																																												
Tidligere undersøgelser og anden behandling																																																												

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																																					
31	Hvor ofte foretager du eller henviser patienter til røntgen optagelse af columna for de følgende hovedpinetyper? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spændingshovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Migræne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cervikogen hovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Spændingshovedpine						Migræne						Cervikogen hovedpine																													
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																	
Spændingshovedpine																																																						
Migræne																																																						
Cervikogen hovedpine																																																						
32	Hvor ofte indeholder din objektive undersøgelse nedenstående elementer i forbindelse med udredning og diagnostik af nye hovedpinepatienter? (Ved 'ny patient' forstås en patient, der aldrig har været i klinikken før, en tidligere patient med hovedpine som nyt problem, eller en patient med tilbagevendende kendt hovedpine efter min. ½ år uden hovedpine). <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blodtryksmåling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Undersøgelse af nakken (ROM, bløddele, bevægepalpation)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gangafvikling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vurdering af mental status (fx svarer relevant på spørgsmål)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kranienerve screening (pupilforhold, øjenbevægelser, følesans og motorik i ansigt, mund- og tungebevægelser, ganesejl)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neurologisk screening af overekstremitet (muskel trofik, muskeltonus, muskelkraft, sensibilitet, reflekser)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koordination og balance (fx Rombergs test)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Blodtryksmåling						Undersøgelse af nakken (ROM, bløddele, bevægepalpation)						Gangafvikling						Vurdering af mental status (fx svarer relevant på spørgsmål)						Kranienerve screening (pupilforhold, øjenbevægelser, følesans og motorik i ansigt, mund- og tungebevægelser, ganesejl)						Neurologisk screening af overekstremitet (muskel trofik, muskeltonus, muskelkraft, sensibilitet, reflekser)						Koordination og balance (fx Rombergs test)					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																	
Blodtryksmåling																																																						
Undersøgelse af nakken (ROM, bløddele, bevægepalpation)																																																						
Gangafvikling																																																						
Vurdering af mental status (fx svarer relevant på spørgsmål)																																																						
Kranienerve screening (pupilforhold, øjenbevægelser, følesans og motorik i ansigt, mund- og tungebevægelser, ganesejl)																																																						
Neurologisk screening af overekstremitet (muskel trofik, muskeltonus, muskelkraft, sensibilitet, reflekser)																																																						
Koordination og balance (fx Rombergs test)																																																						
	7. Monitorering og behandlingseffekt Denne sektion omhandler de redskaber du muligvis benytter i monitoreringen af hovedpinepatienter. En hovedpinedagbog kan hjælpe med at finde en diagnose og vil derfor være nyttig i den indledende fase af hovedpineudredningen. DSK anbefaler hovedpinedagbøger i elektronisk eller papirversion, som kan findes på Migræne og Hovedpineforeningens hjemmeside. En hovedpinekalender kan overvejende anvendes til opfølgning på hovedpine behandling, og DSK anbefaler kalenderen fra Migræne og Hovedpineforeningens hjemmeside.																																																					

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																																																	
33	Hvor ofte benytter du følgende redskaber til monitorering af patienter med hovedpine? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hovedpinedagbog</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedpinekalender</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis der anvendes andre værktøjer til monitorering, angiv hvilke.							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Hovedpinedagbog						Hovedpinekalender						Andet																																									
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																													
Hovedpinedagbog																																																																		
Hovedpinekalender																																																																		
Andet																																																																		
	8. Tværfagligt samarbejde Denne sektion omhandler dit samarbejde med andre sundhedsprofessionelle i håndteringen af hovedpinepatienter.																																																																	
34	Hvor ofte modtager du patienthenvisninger/anbefalinger fra følgende sundhedsprofessionelle i forbindelse med håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen praktiserende læge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kiropraktor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fysioterapeut</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Psykolog</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tandlæge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sundhedsplejerske</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massør</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anden behandler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis du modtager henvisninger/anbefalinger fra andre sundhedsprofessionelle, angiv hvilke sundhedsprofessionelle.							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Almen praktiserende læge						Kiropraktor						Fysioterapeut						Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)						Psykolog						Tandlæge						Sundhedsplejerske						Massør						Anden behandler					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																													
Almen praktiserende læge																																																																		
Kiropraktor																																																																		
Fysioterapeut																																																																		
Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)																																																																		
Psykolog																																																																		
Tandlæge																																																																		
Sundhedsplejerske																																																																		
Massør																																																																		
Anden behandler																																																																		
35	Hvor ofte henviser/anbefaler du patienter til følgende sundhedsprofessionelle i forbindelse med håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almen praktiserende læge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kiropraktor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fysioterapeut</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Psykolog</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tandlæge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sundhedsplejerske</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massør</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anden behandler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis du henviser/anbefaler patienter til andre sundhedsprofessionelle, angiv hvilke sundhedsprofessionelle.							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Almen praktiserende læge						Kiropraktor						Fysioterapeut						Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)						Psykolog						Tandlæge						Sundhedsplejerske						Massør						Anden behandler					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																																													
Almen praktiserende læge																																																																		
Kiropraktor																																																																		
Fysioterapeut																																																																		
Medicinsk specialist (fx neurolog, reumatolog, psykiater etc.)																																																																		
Psykolog																																																																		
Tandlæge																																																																		
Sundhedsplejerske																																																																		
Massør																																																																		
Anden behandler																																																																		

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																							
36	Røde flag: I hvilket omfang er du bekendt med følgende indikationer for yderligere (akut) udredning hos patienter med hovedpine? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ikke bekendt</th> <th>I nogen grad bekendt</th> <th>I høj grad bekendt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tordenskraldshovedpine (pludseligt indsættende hovedpine af svær styrke)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Symptomer på øget intrakranielt tryk (morgenhovedpine, forværring ved host/nys/bugpres, ændret syn)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nyopstået hovedpine hos en patient kendt med cancer eller HIV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedpine/ansigtssmerter ledsaget af feber eller neurologiske udfald</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Progredierende hovedpine over uger</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nyopstået hovedpine hos patienter under 10 år eller over 40 år</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natlige hovedpiner hos børn</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Ikke bekendt	I nogen grad bekendt	I høj grad bekendt	Tordenskraldshovedpine (pludseligt indsættende hovedpine af svær styrke)				Symptomer på øget intrakranielt tryk (morgenhovedpine, forværring ved host/nys/bugpres, ændret syn)				Nyopstået hovedpine hos en patient kendt med cancer eller HIV				Hovedpine/ansigtssmerter ledsaget af feber eller neurologiske udfald				Progredierende hovedpine over uger				Nyopstået hovedpine hos patienter under 10 år eller over 40 år				Natlige hovedpiner hos børn							
	Ikke bekendt	I nogen grad bekendt	I høj grad bekendt																																					
Tordenskraldshovedpine (pludseligt indsættende hovedpine af svær styrke)																																								
Symptomer på øget intrakranielt tryk (morgenhovedpine, forværring ved host/nys/bugpres, ændret syn)																																								
Nyopstået hovedpine hos en patient kendt med cancer eller HIV																																								
Hovedpine/ansigtssmerter ledsaget af feber eller neurologiske udfald																																								
Progredierende hovedpine over uger																																								
Nyopstået hovedpine hos patienter under 10 år eller over 40 år																																								
Natlige hovedpiner hos børn																																								
37	Hvor ofte henviser du patienter med hovedpine til andre sundhedsprofessionelle, baseret på følgende årsager? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For at bekræfte/komme nærmere en diagnose</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>For at forbedre patientens evne til egenhåndtering af hovedpine relateret funktionsnedsættelse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>For at udrede et "rødt flag" (akut udredning)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med henblik på smertelindrende behandling ved akutte hovedpineanfald</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med henblik på hjælp til præventiv hovedpinebehandling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	For at bekræfte/komme nærmere en diagnose						For at forbedre patientens evne til egenhåndtering af hovedpine relateret funktionsnedsættelse						For at udrede et "rødt flag" (akut udredning)						Med henblik på smertelindrende behandling ved akutte hovedpineanfald						Med henblik på hjælp til præventiv hovedpinebehandling					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																			
For at bekræfte/komme nærmere en diagnose																																								
For at forbedre patientens evne til egenhåndtering af hovedpine relateret funktionsnedsættelse																																								
For at udrede et "rødt flag" (akut udredning)																																								
Med henblik på smertelindrende behandling ved akutte hovedpineanfald																																								
Med henblik på hjælp til præventiv hovedpinebehandling																																								
9. Hovedpinehåndtering I Denne sektion omhandler din håndtering af hovedpinepatienter.																																								

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																									
38	Hvor vigtig er følgende behandlingsresultater i din håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ikke vigtigt</th> <th>Ikke særlig vigtigt</th> <th>Neutral</th> <th>Noget vigtigt</th> <th>Meget vigtigt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forebyggelse af hovedpine episoder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kortere hovedpine episoder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Smertelindring under hovedpine episoder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forbedring af hovedpinerelaterede coping strategier</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overordnet forbedring af generelt helbred og velvære</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Ikke vigtigt	Ikke særlig vigtigt	Neutral	Noget vigtigt	Meget vigtigt	Forebyggelse af hovedpine episoder						Kortere hovedpine episoder						Smertelindring under hovedpine episoder						Forbedring af hovedpinerelaterede coping strategier						Overordnet forbedring af generelt helbred og velvære					
	Ikke vigtigt	Ikke særlig vigtigt	Neutral	Noget vigtigt	Meget vigtigt																																					
Forebyggelse af hovedpine episoder																																										
Kortere hovedpine episoder																																										
Smertelindring under hovedpine episoder																																										
Forbedring af hovedpinerelaterede coping strategier																																										
Overordnet forbedring af generelt helbred og velvære																																										
39	Spændingshovedpine: hvor ofte bruger du følgende behandlingsmuligheder i din håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manipulation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvelser</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rådgivning om hovedpine trigger faktorer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis du anvender 'Andet', angiv hvilke andre behandlingsmuligheder du anvender							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Manipulation						Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling						Øvelser						Rådgivning om hovedpine trigger faktorer						Andet					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																					
Manipulation																																										
Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling																																										
Øvelser																																										
Rådgivning om hovedpine trigger faktorer																																										
Andet																																										
40	Migræne: hvor ofte bruger du følgende behandlingsmuligheder i din håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manipulation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvelser</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rådgivning om hovedpine trigger faktorer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis du anvender 'Andet', angiv hvilke andre behandlingsmuligheder du anvender							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Manipulation						Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling						Øvelser						Rådgivning om hovedpine trigger faktorer						Andet					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																					
Manipulation																																										
Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling																																										
Øvelser																																										
Rådgivning om hovedpine trigger faktorer																																										
Andet																																										

Spørgsmål #	Dansk generisk spørgeskema																																									
41	Cervikogen hovedpine: hvor ofte bruger du følgende behandlingsmuligheder i din håndtering af hovedpinepatienter? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aldrig</th> <th>Sjældent</th> <th>Indimellem</th> <th>Ofte</th> <th>Altid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manipulation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvelser</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rådgivning om hovedpine trigger faktorer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Hvis du anvender 'Andet', angiv hvilke andre behandlingsmuligheder du anvender							Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid	Manipulation						Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling						Øvelser						Rådgivning om hovedpine trigger faktorer						Andet					
	Aldrig	Sjældent	Indimellem	Ofte	Altid																																					
Manipulation																																										
Massage, myofasciel teknik eller triggerpunkts behandling																																										
Øvelser																																										
Rådgivning om hovedpine trigger faktorer																																										
Andet																																										
	10. Hovedpinehåndtering II Denne sektion omhandler dine behandlingsplaner for hovedpinepatienter.																																									
42	Angiv det gennemsnitlige antal konsultationer du forventer totalt set i et behandlingsforløb af en ny patient med følgende hovedpinetyper som primære klage? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0-4</th> <th>5-7</th> <th>8-10</th> <th>11 eller flere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spændingshovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Migræne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cervikogen hovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							0-4	5-7	8-10	11 eller flere	Spændingshovedpine					Migræne					Cervikogen hovedpine																				
	0-4	5-7	8-10	11 eller flere																																						
Spændingshovedpine																																										
Migræne																																										
Cervikogen hovedpine																																										
43	Angiv den forventede gennemsnitlige varighed af et behandlingsforløb af en ny patient med følgende hovedpinetyper som primære klage? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-2 uger</th> <th>3-5 uger</th> <th>6-8 uger</th> <th>9 uger eller mere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spændingshovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Migræne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cervikogen hovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							1-2 uger	3-5 uger	6-8 uger	9 uger eller mere	Spændingshovedpine					Migræne					Cervikogen hovedpine																				
	1-2 uger	3-5 uger	6-8 uger	9 uger eller mere																																						
Spændingshovedpine																																										
Migræne																																										
Cervikogen hovedpine																																										
44	Angiv den forventede gennemsnitlige hyppighed i et behandlingsforløb af en ny patient med følgende hovedpinetyper som primære klage? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Én gang om ugen</th> <th>To gange om ugen</th> <th>Tre gange om ugen</th> <th>Mere end tre gange om ugen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spændingshovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Migræne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cervikogen hovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Én gang om ugen	To gange om ugen	Tre gange om ugen	Mere end tre gange om ugen	Spændingshovedpine					Migræne					Cervikogen hovedpine																				
	Én gang om ugen	To gange om ugen	Tre gange om ugen	Mere end tre gange om ugen																																						
Spændingshovedpine																																										
Migræne																																										
Cervikogen hovedpine																																										
45	Hvor effektiv opfatter du den behandling du som kiropraktor giver af følgende hovedpinetyper? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ikke effektiv</th> <th>Sjældent effektiv</th> <th>Nogle gange effektiv</th> <th>Ofte effektiv</th> <th>Svært at angive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spændingshovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Migræne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cervikogen hovedpine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Ikke effektiv	Sjældent effektiv	Nogle gange effektiv	Ofte effektiv	Svært at angive	Spændingshovedpine						Migræne						Cervikogen hovedpine																	
	Ikke effektiv	Sjældent effektiv	Nogle gange effektiv	Ofte effektiv	Svært at angive																																					
Spændingshovedpine																																										
Migræne																																										
Cervikogen hovedpine																																										
46	Beskriv de hyppigst oplevede bivirkninger efter behandling af patienter med hovedpine																																									
47	Har du kommentarer til besvarelsen eller deltagelsen i projektet?																																									